

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E COMPORTAMENTI IN SALA OPERATORIA

- Nel corso di interventi su pazienti accertati/sospetti COVID-19 oppure in emergenza, durante la fase dell'intubazione, il personale di sala deve indossare i DPI raccomandati per l'esecuzione di procedure che generano aerosol.
- La vestizione e la svestizione degli operatori sanitari deve essere eseguita rispettando rigorosamente le manovre atte a ridurre il rischio di contaminazione. Se possibile, dovrà essere supervisionata da un osservatore addestrato. L'assistenza attiva durante la svestizione costituisce un'opportunità per minimizzare il rischio di contaminazione accidentale.
- Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di componenti dell'equipe; tutto il personale non strettamente necessario è escluso dall'ingresso in sala operatoria.
- I rifiuti sanitari devono essere smaltiti come rifiuti sanitari a rischio infettivo.
- I dispositivi medici riutilizzabili devono essere bonificati secondo le procedure di disinfezione dei dispositivi specifiche per SARS-CoV-2.
- La teleria utilizzata deve essere eliminata se monouso o collocata nei sacchi dedicati al percorso previsto per la biancheria infetta.
- Devono essere sottoposte a disinfezione tutte le superfici degli strumenti e dei dispositivi, tra cui il tavolo dello strumentario, il tavolo operatorio, le apparecchiature per circolazione extracorporea
- Eventuali residui di sangue o di altri fluidi biologici devono essere completamente rimossi prima della disinfezione seguendo le procedure interne.
- Per le superfici si dovrà utilizzare un disinfettante contenente lo 0,1% di cloro attivo o nel caso di superfici non trattabili con cloro, utilizzare soluzioni alcoliche al 70% rispettando il tempo di contatto indicato nella scheda tecnica del disinfettante in uso.